Asertistements agre wees. Ed de le DIP19-4-53060600 orahism langue due Roushillon, Cauragais t dans le bate dennie paru no14, mai 1991. ssemen

PUBLICATION PÉRIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

ISSN 0755-66-24

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Avertissement destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès "rédigé en collaboration" avec les GDA, les Coopératives et la ferme de Loudes

N° 7 C du 14/04/93

GRANDES CULTURES N° 2

100 HSOSA

COLZA l'exist auso els

Asuhissement agricules: Ed.

Nous n'avons pas observé de pucerons au cours de notre dernière tournée, surveillez toutefois vos cultures, et intervenez en cas de nécessité à l'aide d'un aphicide strict comme : PIRIMOR G à 0,5 Kgs/Ha Roushil Com . Grande cultures

> ou MAVRIK FLO à 0,2 L/Ha KARATE à 0,15 L/Ha · SERK EC à 1.5 L/Ha

> > POIS

R.A.S. Bon état sanitaire pour le moment



BLES DURS: La Rouille Brune est partout présente, ce qui laisse présager d'une attaque précoce de cette maladie; sur certaines cultures très hatives, le niveau est tel qu'une première intervention est nécessaire (variétés sensibles au stade 2 noeuds dans le Carcassès, le Razès et certains semis précoces du Lauragais).

Toutes les variétés n'ont pas la même sensibilité; une observation de vos cultures s'impose.

Les stades s'échelonnent du stade 5 au stade 7.

stade 7 (2 noeuds) présentant de la Rouille toutes cultures au systématiquement sur les feuilles de la base.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



L'Oïdium peut être observé sur les parcelles les plus précoces et les plus denses, cependant son niveau de développement reste faible et ne justifie pas de l'utilisation d'anti-Oïdium plus spécifiques que les Triazoles (Fongicides conseillés sur cet avertissement).

En cas de nécessité, utilisez une des spécialités suivantes :

GRANIT TR à 1,5 L/Ha ARPEGE à 1,25 L/Ha SPOT à 1,5 L/Ha

La Septoriose, quasi inexistante sur les cultures, peut s'observer sur des repousses.

En cas de développement, les produits conseillés assurent la couverture de ce risque.

SI VE SIMON IN TEXTIFICATION DESCRIPTION

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

* BLES TENDRES : R.A.S.

* ORGES : R.A.S.